


## 台湾キドクガにきをつけよう・・・



とくちよう  
**【特徴】**  
 台湾キドクガの幼虫は、大きくなっても2cmでいどです。  
 せなかのオレンジ色の線と黒いこぶが特徴です。

◎台湾キドクガの幼虫は、体表に毒針毛と呼ばれる0.1mmほどの目に見えない毛がたくさんあります。

幼虫に直接接触したり、風でとんできた、毒針毛に接触することで皮膚炎を発症します。毒針毛は幼虫だけでなく、卵、幼虫の脱皮殻、さなぎ、成虫(蛾)にもあります。



毒針毛(写真)

【症状】 かゆみや、赤いブツブツなどの症状があらわれます。

- ① 幼虫が皮膚に接触した直後からかゆみやブツブツがでる。
  - ② 1～2日後にかゆみの強い紅斑や丘疹がでる
- 2つのタイプがあります。



【応急処置】

- かゆみがあってもぜったいにかかないでください！  
 かくと毒針毛で皮膚をこすることになり、症状が広がります。  
 まず、①粘着テープをかゆい箇所やその周辺にはってはがし毒針毛をとりのぞきます。  
 ②石けんをつけてきれいにあらいます。

かゆみや赤みがひどい場合は、病院でみてもらいましょう。

(保健室の様子です)

**内科的症狀**

先週から腹痛、下痢、微熱などの症状で、保健室を利用する児童や欠席者が増えています。朝から体調がすぐれないときは、無理をせずゆっくり休ませてください。また症状がおもしくない時、続く場合は一度病院でみてもらいましょう。ご協力よろしくお願ひします。

※北部保健所情報：インフルエンザ、感染性胃腸炎などの警報はありません。

**外科的症狀**

すり傷、打撲、虫刺されの来室が多いです。今回は頭の打撲について資料を裏面に載せています。ぜひ参考にしてください(\*^\_^\*)



# なに？ なせ？ なあに？

## 頭をけがしたときは？

頭を強く打ったり、ぶつけたとき、自分では気づかないことが多いのですが、脳によくない影響を受けていることがあります。

頭の中には、たくさんの血管があります。たとえば、手や足をすりむいて血が出てくるのと同じように、頭の中で血管がやぶれます。頭の中に血がたまってしまうことは、とても危険です。



### ★とくにここがあぶない！

耳をかくすように両手を当ててみよう。


耳でかくれるこの部分は頭の骨がやわらかいので、ひびがはいったり、中に血がたまりやすいところです。



※学校にいるとき、ここを打ったり、ぶつけたときは、小さなけがでも保健室へ行くこと！

◎頭の中に血がたまってしまうと、突然具合が悪くなったり、意識がなくなったりします。それが…

- ①頭を打った後すぐ
- ②頭を打って、1～2日してから
- ③頭を打って、1～3カ月してから



起こることがありますので注意してください。したがって、頭を打った後1～2日はできるだけ静かにして様子を見ることが大切です。

そして、頭を打った後から、こんなことが起きていないか自分で気をつけてみましょう。

- 1) 頭の痛みがだんだん強くなる
- 2) 食べ物ははいたり、何も食べていないのにはいってしまうことが何回もある
- 3) 急に眠くなってきて起きていられない
- 4) ものがよく見えなかったり、一つのものがだぶって見える
- 5) 手、足が動きにくかったり、しびれたりする
- 6) けいれん（からだがかかってにびくびく動く）が起こる
- 7) けがをしたときのことを思い出せない

※こんなことが起きていたら、すぐに先生またはおうちの人に言って専門の病院でみてもらいましょう。

### ●知れ

頭を打ったあと、意識があるようならとにかく冷やすこと。  
出血がある場合は清潔なガーゼで傷を覆っておきましょう。  
ただし、その時は元気で1～2日ほど様子を見ましょう。少しずつ頭が骨の中で出血していることがあり、最悪の場合死に至ることもあります。

### そのほか


- ・吐く
  - ・呼吸が荒い
  - ・ひきつける
  - ・ふだんはかかない、いびきをかく
  - ・ウトウトして、顔色が悪い
  - ・光をまぶしがっていやがる
- のときは、すぐに救急車を呼んでください。

### ●意識がない場合



頭を高くする。

### ●耳や鼻から、血や水のような液体が流れ出ている場合



液が出た側を下向きに。